

Эмийн хэрэглэлийн чийгээн
Бүрд эмийн бодилтуулж
бийхийг

Энэ бэлдмэлийг хэрэглэхийн өмнө зааврыг анхааралтай уншиж танилцана уу. Дахин унших шаардлага гарч мэдэх учир зааврыг хадгалаарай. Нэмэлт мэдээлэл, зөвлөгөөг эмчлэгч эмч, эм зүйчээсээ аваарай.

Диксааруулга, сарынхуучин

Исла-Минт пискилгээний

Сорбитын амт, сорбат

нэгнэвэлтийн

Эмийн хэрэглээний заавар. Эмчлүүлэгчдэд зориулав

Исла минт

пастилк

Найрлага. нэг пастилkad

Үйлчлэгч бодис: "Исланд мохын" 100 мг усан ханд (2-4:1).

Туслах бодис:

Сорбитын талстжаагүй 70 % уусмал (E420); аспартам (E951); акаци (Gummi Arabic); гааны хурц амттай тос (Ol. menthae piperitae); зөгийн бал, хлорофилийн нэгдэл (E141), эрдсийн агууламжтай зөөлөн тос, цэвэр ус.

Эмийн хэлбэр: пастилк

Эмийн эмчилгээний бүлэг: хоолойн өвчинд хэрэглэх бэлдмэл

Хэрэглэх заалт

- хоолойн халдвар ба харшлын шалтгаант үрэвсэлт өвчнүүд: хоолой залгиурын үрэвсэл (фарингит, ларингит) түүний дотор харшлын шалтгаант хуурай "хуцуулсан" ханиалганаас болж хоолой сөөх
- цочмог ба архаг бронхитийн үеийн хуурай ханиалгын шинж тэмдгийн эмчилгээ ба бронхийн багтрааны үед хийх, иж бүрдэл эмчилгээнд хавсрата болгон
- хоолойны дууны хөвчийн хэт ачааллын үед (дуучид, багш, лекторуудад)
- хоолой залгиур, амны хөндийн салстын хуурайшил ба цочрол (халаалт, хөргөлтийн төхөөрөмжийн нөлөөнөөс шалтгаалан байрны агаар хэт хуурайшсанаас болж хоолой амны салст хатаж хуурайших, хамар битүүрч, хамраараа амьсгалах боломж хязгаарлагдсан үед, спортын тэмцээн уралдааны үед)

Хориглох заалт

- Фенолкетон шээсээр гадагшилж байгаа үед бэлдмэлийн найрлагад чихэрлэг бодис- аспартам агуулагддаг болохыг тооцож үзэх
- Фруктоз тохирдоггүй хүнд хэрэглэж болохгүй
- Исла-Минт бэлдмэлийн найрлагад орсон аль нэг бодист хэт мэдрэгшилтэй (харшилтай) бол



Эмийн харилцан үйлдэл

Бусад эмийн бэлдмэлүүдтэй харилцан үйлчлэлцсэн тухай мэдээлэл одоогоор байхгүй.

Анхааруулга, сээрэмжлүүлэг

Исла-Минт пастилкийн найрлагад байгаа эмийн ургамалын экстрактууд заримдаа бэлдмэлийн амт, өнгийг өөрчилж болох ч энэ нь түүний эмчилгээний үйлдэлд нөлөөлөхгүй.

Исла-Минт бэлдмэлийн найрлагад сахар агуулагддаггүй. Тиймээс энэ бэлдмэлийг чихрийн шижин өвчтэй хүнд хэрэглэх боломжтой. (1 пастилkad 0,03 талхны нэгж = 0,385 г нүүрс ус агуулагддаг)

Жирэмсэн ба хөхүүл хүүхэдтэй эхэд, энэ бэлдмэлийг бусад бүх эмийн бэлдмэлүүдийн нэгэн адил эмчээс зөвлөлгөө авсны дараа хэрэглээрэй.

Хэрэглэх арга, тун

Насанд хүрэгчид ба 12-с дээш насны хүүхэд: 1 пастилкийг 2 цаг тутамд (хоногт 12 пастилк) амандаа хийн хүлхэж, аажмаар уусгаж хэрэглэнэ.

Хүүхэд: 4 -12 настай хүүхэд 1 пастилкийг 2 цагийн зайтай (хоногт 6 пастилк) амандаа хийн хүлхэж, аажмаар уусгаж хэрэглэнэ.

Энэ эмийн зохимж сайн учраас Исла-Минт пастилкийг ямар нэгэн болгоомжлолгүйгээр удаан хугацаагаар хэрэглэж болохоос гадна, өвчний шинж тэмдэг бүрэн арилснаас хойш дахин 2-3 хоног хэрэглэж, эмчилгээний үр нөлөөг батжуулах хэрэгтэй.

Хэрэв 4-5 өдөр хэрэглэсний дараа өвчний шинж тэмдэг багасахгүй, өвчтөний биеийн байдал муудаж, амьсгаадах, халуурах, идээт болон цустай цэр гарч байвал эмчээс зөвлөлгөө авах хэрэгтэй.

Гаж нөлөө

Ховор тохиолдолд харшлын урвал үүсч болно. Бэлдмэлийн найрлагад сорбит агуулагддаг учраас хэт мэдрэг өвчтөнд, маш ховор тохиолдолд туулгах үйлдэл үзүүлж болно.

Эмийн хэлбэр , савлалт

Нэг савтай бэлдмэлд 30 ширхэг пастилк савлагдсан. (ПВХ ба хөнгөн цагаан фольга материалыаар хийсэн нэг үүрэн саванд 10 ширхэг пастилкийг багцлан хийж савласан)



Хадгалах хугацаа 4 жил
Хадгалах хугацаа нь дууссан тохиолдолд хэрэглэхийг хориглоно.

Хадгалах нөхцөл
Тасалгааны 25°C-с ихгүй хэмд хадгална. Хүүхэд хүрэхээргүй газарт хадгал!

Эмийн сангаас олгох нөхцөл Жоргүй олгоно

Үйлдвэрлэсэн

Герман улс: 61138 Нидердорфельден, Херцбергштрассе 3

Энгельгард Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ.

